



# BULLETIN TECHNIQUE 20-3-59 008049

## de la Station d'Avertissements Agricoles

### RHONE-ALPES

4, Place Gensoul — LYON Téléphone: 37-20-56  
C. C. P. LYON 9430-12 Régisseur Recettes Protection végétaux

Lisez sur l'enveloppe de votre bulletin  
le numéro de votre région

N° 247

21 Mars 1959

#### AVERTISSEMENTS

##### TAVELURE DU POMMIER

Dans une grande partie de la Circonscription ( trois quarts Sud et Est) les ~~périthèces~~ (forme de conservation hivernale) de la tavelure sont arrivés en grande quantité à un état de maturité qui laisse prévoir des attaques primaires importantes dès la première pluie tiède.

Sur toutes les variétés qui ont atteint le stade C3 de Fleckinger, le premier traitement devra être appliqué d'urgence. Dans les autres cas il sera effectué au fur et à mesure que les pommiers parviendront à ce stade.

De toutes façons dans le Rhône et la Loire, on attendra un avis ultérieur pour traiter.

##### TAVELURE DU POIRIER

Le premier traitement ne devra être renouvelé que dans les régions ci-dessous où les chutes de pluie et de neige du I7 ont entraîné une partie du produit.

ARDECHE : en totalité

DROME : I25 - I31 - I32 - I33 - I34 - I36

##### CECIDOMYIE DU POIRIER ( poires calebassées )

Dans les seuls foyers où cet insecte a été observé ces dernières années, on appliquera d'urgence un traitement à l'aide d'un des produits suivants :

- ( D.D.T. ou H.C.H. à raison de 100 gr / hl de matière active
- ( Lindane à raison de 12 gr / hl de matière active

#### INFORMATIONS

##### O'DIUM DU POMMIER

Le traitement conseillé par le bulletin n° 246 devra être renouvelé dès la première poussée de végétation.

##### XYLEBORE

Nous rappelons que cet insecte du bois, responsable depuis une douzaine d'années d'importants dégâts sur toutes essences fruitières, devra être combattu dès que la température à l'ombre dépassera 19°.

On utilisera soit de l'H.C.H., du Lindane, ou du D.D.T. aux doses doubles des doses normales, soit un oléoparathion.

*P. 1249*

ACARIENS SUR ARBRES FRUITIERS

Sur les arbres fruitiers où des araignées rouges sont rentrées en activité, on n'entreprendra un traitement que si la température est redevenue élevée pour la saison.

PUCERONS

Les premiers pucerons du pêcher ont été observés récemment ; des éclosions de puceron vert du pommier ont également pu être notées çà et là dans les conditions les plus favorables.

Nous rappelons que ces insectes doivent être combattus dès l'apparition des premiers individus mais que les produits utilisés n'ont toute leur efficacité que si la température est assez élevée ( 18° au moins à l'ombre dans l'après-midi ).

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles

P. LATARD

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux

A. PITHIoud.